


ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ:




Разжимать человеку зубы, при-
держивать язык или **вставлять**
какие-либо предметы в рот.



Переносить человека с места,
где случился приступ, если
только оно не является опас-
ным для жизни.



Пытаться насильственно **сдер-
живать судорожные движения.**



Делать искусственное дыха-
ние или **массаж сердца.**



Пытаться **дать выпить воды**
или какие-либо лекарственные
препараты.

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ:



Защитите голову больного
от возможной травмы, при
возможности **подложите** что-ни-
будь **мягкое под голову** (сверну-
тую одежду, полотенце и т.п.)



Освободите окружающее
пространство от мебели,
режущих предметов в целях
предотвращения травматиза-
ции больного эпилепсией.



Освободите
от тесной одежды.



Поверните голову на бок для
предотвращения западения
языка и попадания слюны
в гортань.



При возникновении рвоты
осторожно **поверните голову**
на бок для предотвращения
аспирации рвотных масс и по-
падания их в легкие.



После того как судорожные
движения прекратились, **по-
верните** человека **на бок.**



Проверьте, если дыхание
затруднено, **не блокируют ли**
заднюю часть гортани слюна,
рвотные массы или зубные
протезы.

- Судороги прекратятся сами по себе **через несколько минут.**
- После окончания приступа может возникнуть **спутанность сознания, слабость** или **сонливость.**
- **Оставайтесь рядом** до того момента, когда человек придет в сознание. При необходимости, **помогите организовать доставку пострадавшего домой.**
- Если приступ продолжается **больше 5-10 минут,** или приступы следуют один за другим, или человек получил травму, **необходимо вызвать «скорую помощь».**